



# **SEGURO SOCIAL DE SALUD GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD**

---

## **COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE LEPTOSPIROSIS EN LA RED ASISTENCIAL LORETO.**


**Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria**

**ESSALUD - 2019**

### Situación epidemiológica del Zika en el Hospital II Jaén. EsSalud, 2019.


- ✓ En el comportamiento epidemiológico del Leptospirosis a nivel de la Red Asistencial Loreto, el 50% de los casos notificados se concentran desde el 30/12/19 (SE 01) hasta la SE 11. habiéndose notificado en promedio 7 casos por día (DE ± 4; Min: 2 Max:13), siendo la Semana Epidemiológica N°06 con mayor número de casos notificados (13) (Gráfico N°03).
- ✓ El 12% de los casos son sospechosos, solo el 15% fue confirmado y el 78% fue descartado (Gráfico N°04); los casos confirmados se concentran entre la SE 13 hasta SE 28.

Gráfico N° 01  
Tendencia de Casos de Leptospirosis en la Red Asistencial Loreto.  
EsSalud 2019.



Fuente: Vigilancia de Prioridades Sanitarias y Enfermedades de Notificación Obligatoria.  
Elaboración: Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria – GCPS/EsSalud, 02/08/2019.

Gráfico N° 01  
Tipo de Casos de leptospirosis según semana epidemiológica en la Red Asistencial Loreto.  
EsSalud 2019.



Fuente: Vigilancia de Prioridades Sanitarias y Enfermedades de Notificación Obligatoria.  
Elaboración: Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria – GCPS/EsSalud, 02/08/2019.



**GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD**  
**OFICINA DE INTELIGENCIA E INFORMACIÓN SANITARIA**  
**Lima, Agosto de 2019**